Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:03

Link do produktu: https://suplementiarz.eu/vitacea-witamina-c-w-kroplach-dla-dzieci-od-1-miesiaca-30-ml-p-531.html



VitaCea witamina C w kroplach dla dzieci od 1. miesiąca 30 ml

Cena	**10,99 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Kod EAN	**5906071041889**

Opis produktu

VitaCea witamina C w kroplach dla dzieci od 1. miesiąca 30 ml to suplement diety przeznaczony dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Preparat zawiera witaminę C w wygodnej formie kropli, dzięki czemu łatwo dopasować porcję do wieku dziecka. Produkt przed spożyciem wymaga rozcieńczenia.

Witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego, pomaga utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne oraz wspomaga prawidłową produkcję kolagenu.

Witamina C dla niemowląt, dzieci i młodzieży

VitaCea pozwala dostosować ilość witaminy C do wieku. 5 kropli dostarcza 25 mg witaminy C, 10 kropli – 50 mg, a 15 kropli – 75 mg. Forma kropli jest praktyczna szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci, które nie mogą stosować tabletek lub kapsułek.

Skład

Składniki: Glicerol (substancja zagęszczająca), witamina C (kwas L-askorbinowy), woda.

Składnik	5 kropli	% RWS*	10 kropli	% RWS*	15 kropli	% RWS*
Witamina C	25 mg	31%	50 mg	63%	75 mg	94%

*% RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Sposób użycia

- niemowlęta powyżej 1 miesiąca i dzieci do 3 roku życia: 5 kropli na dobę,
- dzieci powyżej 3 roku życia: 10 kropli na dobę,
- dzieci w wieku szkolnym i młodzież: 15 kropli na dobę.

Produkt przed spożyciem wymaga rozcieńczenia.

Dla kogo?

VitaCea przeznaczona jest dla niemowląt powyżej 1. miesiąca życia, dzieci i młodzieży jako uzupełnienie codziennej diety w witaminę C. Sprawdzi się szczególnie u osób szukających preparatu w płynnej formie, z możliwością łatwego dostosowania porcji do wieku.

Ważne informacje

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Należy zachować ostrożność w przypadku niewydolności nerek, występowania zaburzeń spichrzania żelaza, niedoboru erytrocytarnej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Należy przerwać przyjmowanie witaminy C na 2 do 3 dni przed oddaniem materiału do badań krwi i moczu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od wilgoci i światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Pojemność

30 ml

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice